

# Vacuna CDVac Aftosa

## RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIÓN



### Previo a la vacunación

- Programe los trabajos con antelación para minimizar errores.
- Se recomienda encerrar los animales la noche previa a la vacunación, en un corral cerca de la manga con acceso a bebederos. En caso de no ser posible el encierro, movilizarlos con tiempo para que puedan descansar antes de ser vacunados.
- Mantenga las vacunas siempre refrigeradas en un rango entre 4° y 8°C; para tal fin se recomienda el uso de conservadoras con sensores de temperatura.
- Si la jornada de trabajo se prolonga, se recomienda llevar una conservadora sólo con geles refrigerantes para

cambiarlos durante el día.

- Prepare todo el instrumental necesario (jeringas, agujas, etc.) y verifique el correcto funcionamiento y limpieza de los mismos. Recuerde tener en cuenta los calibres de las agujas según los animales a vacunar y lleve una jeringa de repuesto por cualquier eventualidad.




- Al momento de calcular las dosis a utilizar, considere llevar un excedente de entre un 5-10%, para evitar pérdida de dosis por purgar las jeringas o rotura de algún frasco.
- Revise las instalaciones para asegurarse que los animales y operarios no queden expuestos a posibles accidentes.

## Durante la vacunación

- Se recomienda no vacunar en días de lluvia.
- Evite aplicar la vacuna en áreas sucias con barro o bosta.
- Desplace los animales en los corrales y manga de manera tranquila para asegurar de esta manera el cuidado y bienestar de los mismos.
- Vacune sólo animales en buen estado de salud y nutrición.
- Antes de cargar la jeringa, agite el producto enérgicamente para homogenizarlo.
- Cargue las jeringas de manera lenta y constante, para evitarla entrada de aire. En caso de ocurrir el ingreso de aire, purgue la jeringa antes de vacunar.
- Evite cargar una jeringa pinchando el frasco con una aguja sucia.
- En caso de no utilizar agujas descartables, se recomienda cambiar las mismas cada 25/50 animales.
- Según la vía de inoculación, se recomienda el uso de los siguientes calibres de aguja:

CATEGORIA	SUBCUTANEA	INTRAMUSCULAR
Terneros	12x15	15x18
Adultos	12x18	20x20

- La aplicación intramuscular, deberá realizarla en los músculos del cuello, específicamente en el tercio medio superior del cuello.
- La aplicación subcutánea, se recomienda realizarla en el área detrás de la paleta. Para dicha aplicación, se debe tomar la piel con una mano generando un pliegue, luego se debe inocular la vacuna en el espacio generado por dicho pliegue.



## Posterior a la vacunación

- Se recomienda dejar los animales en observación al menos una hora luego de la aplicación, para asegurarse que no haya reacciones indeseables.
- En caso de presentarse una reacción anafiláctica, se recomienda el uso de Epinefrina, Dexametasona y algún antihistamínico.

- Los frascos con remanente de vacuna deberán ser descartados.
- Enjuague y quite los restos de producto del instrumental de trabajo.
- Deseche todas las agujas utilizadas del lugar de trabajo.
- Complete las planillas requeridas.

Ante cualquier consulta respecto del producto, vías de inoculación o inquietud no dude en contactarse con el Servicio Técnico de CDV al  +54 9 11 3312-2238

# #SanidadInteligente