

Vacuna

CDVac Clostrimax 8



Preventivo de Mancha, Gangrena gaseosa, Enterotoxemia, Edema maligno, Hepatitis necrótica, Muerte súbita y Tétanos, producidas por bacterias clostridiales.

Composición: Anacultivos y toxoides de *Clostridium chauvoei*, *Clostridium septicum*, *Clostridium perfringens* tipos A, B, C y D, *Clostridium novyi* tipo B y *Clostridium tetani*, a partir de cepas aisladas de casos clínicos, inactivados, con adyuvante de hidróxido de aluminio.

Administración y dosis: Bovinos: 5 ml, vía subcutánea. Ovinos y caprinos: 2 ml, vía subcutánea. Aplicar dos dosis con 20-30 días de intervalo en la primoinoculación a bovinos mayores de 3 meses de edad. Se puede aplicar a hembras gestantes. Revacunar 1 o 2 veces al año, según criterio del Médico Veterinario.

Presentación: Frascos de 25 ml (5 dosis bovinas y 12 dosis ovinas y caprinas), 50 ml (10 dosis bovinas y 25 dosis ovinas y caprinas), 100 ml (20 dosis bovinas y 50 dosis ovinas y caprinas) y 250 ml (50 dosis bovinas y 125 dosis ovinas y caprinas).

Certificado: xxxxxxxx



#SanidadInteligente