


Vacuna

CDVac Clostrimax P-B



Preventivo de Mancha, Gangrena gaseosa, Enterotoxemia, Edema maligno, Hepatitis necrótica, Muerte súbita, Cabeza hinchada, Hemoglobinuria, Botulismo producidas por bacterias clostridiales y cuadros respiratorios causados por Pasteurelosis.

Composición: Anacultivos y toxoides de *Clostridium chauvoei*, *Clostridium septicum*, *Clostridium perfringens* tipo A, B, C y D, *Clostridium novyi* tipo A, B y D (*C. haemolyticum*), *Clostridium sordelli*, *Clostridium botulinum* tipo C y D y bacterina de *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica* (*Pasteurella haemolytica*), a partir de cepas aisladas de casos clínicos, inactivados, con adyuvante de hidróxido de aluminio.

Administración y dosis: Bovinos: 5 ml; vía subcutánea. Ovinos: 3 ml; vía subcutánea. Aplicar dos dosis con 20-30 días de intervalo en la primoinoculación a bovinos mayores de 3 meses de edad. Se puede aplicar a hembras preñadas en cualquier trimestre de la gestación. Revacunar 1 o 2 veces al año, según criterio del profesional.

Presentación: Frascos de 50 ml (10 dosis bovinas y 16 dosis ovinas), 125 ml (25 dosis bovinas y 40 dosis ovinas) y 250 ml (50 dosis bovinas y 80 dosis ovinas).

Certificado: 0646/E



#SanidadInteligente