

Vacina

CDVac Clostrimax 8



Preventiva de perna preta, gangrena gasosa, enterotoxemia, edema maligno, hepatite necrótica, morte súbita e tétanos, causadas por bactérias clostrídios em bovinos e ovinos.

Composição: Anaculturas e toxóides *Clostridium chauvoei*, *Clostridium septicum*, *Clostridium perfringens* tipo A, B, C e D, *Clostridium novyi* tipo B e *Clostridium tetani*, a partir de cepas isoladas de casos clínicos, inativadas, com adjuvante de hidróxido de alumínio.

Administração e dosagem: Bovinos: 5 ml, via subcutânea. Ovinos e caprinos: 2 ml, via subcutânea. Aplicar duas doses com intervalo de 20-25 dias na primoinoculação em bovinos com mais de 3 meses de idade. Pode ser aplicada em fêmeas gestantes. Revacinar 1 ou 2 vezes ao ano, conforme critério do médico veterinário.

Apresentação: Frascos de 100 ml (20 doses bovinas e 50 doses ovinas e caprinas), 125 ml (25 doses bovinas e 40 doses ovinas e caprinas) e 250 ml (50 doses bovinas e 125 doses ovinas e caprinas).

SENASA certificado: 0772/E



#SaúdeInteligente