

CARBÚNCLO



Vacina CDVac Carbúnculo

Preventiva de carbúnculo bacteridiano causado pelo *Bacillus anthracis* em bovinos, ovinos, suínos e equinos.

Composição: Cada ml de vacina contém no mínimo 9.000.000 de esporos encapsulados, apatogênicos de *Bacillus anthracis*, cepa Sterne, suspensos em solução tampão glicerina saponificada.

Administração e dosagem: Bovinos: 2 ml; via subcutânea. Ovinos, equinos, suínos: 1 ml; via subcutânea. Aplicar a partir dos 3 meses de idade. Revacinar 1 ou 2 vezes ao ano conforme critério do médico veterinário. Períodos de restrição pré-abate: 14 dias.

Apresentação: Frascos de 50 ml (25 doses bovinas e 50 doses ovinas, suínas e equinas), 125 ml (62 doses bovinas, ovinas, suínas e equinas) e 250 ml (125 doses bovinas e 250 doses ovinas, suínas e equinas).

SENASA certificado: 00-102



RAIVA



Vacina CDVac Raiva

Preventiva de raiva paralítica bovina e raiva ovina, caprina, suína, equina, canina e felina

Composição: Cultura inativada do vírus da raiva, cepa Pasteur, em células BHK, com adjuvante de hidróxido de alumínio.

Administração e dosagem: Bovinos, ovinos, caprinos, suínos e equinos: 2 ml, via subcutânea ou intramuscular. Aplicar a partir dos 3 meses de idade e reforçar aos 6 meses. Revacinar anualmente. Caninos e felinos: 1 ml, via subcutânea. Aplicar a partir dos 3 meses de idade. Revacinar anualmente, conforme critério do profissional.

Apresentação: Frascos de 100 ml (50 doses bovinas, ovinas, caprinas, suínas e equinas) e doses únicas (caninos e felinos).

SENASA certificado: 08-003



AFTOSA



Vacina CDVac Aftosa Monovalente

Prevenção de febre aftosa destinada às espécies bovina, ovina, suína e caprina.

Composição: Contém vírus da febre aftosa tipo 0 em células BHK, inativados com BEI, com adjuvante oleoso.

Administração e dosagem: Bovinos e suínos: 2 ml. Ovinos e caprinos: 1ml. Administrar por via intramuscular profunda ou subcutânea atrás da omoplata ou tabela do pescoço. Ela confere imunidade ativa por 6 meses em animais com menos de 6 meses de idade e primovacina-dos e 12 meses em animais revacinados. Revacinar a cada 6 meses com dose única. Aplicar em bovinos com mais de 3 meses. Pode ser aplicada em fêmeas prenhes.

Apresentação: Frascos de 100 ml (50 doses bovinas e suínas e 100 doses ovinas e caprinas) e 250 ml (125 doses bovinas e suínas e 250 doses ovinas e caprinas).

SENASA certificado: 1067/E



Vacina CDVac Aftosa Bivalente

Prevenção de febre aftosa destinada às espécies bovina, ovina, suína e caprina.

Composição: Contém os tipos A e O do vírus da febre aftosa em células BHK, inativados com BEI, com adjuvante oleoso.

Administração e dosagem: Bovinos e suínos: 2 ml. Ovinos e caprinos: 1ml. Administrar por via intramuscular profunda ou subcutânea atrás da omoplata ou tabela do pescoço. Ela confere imunidade ativa por 6 meses em animais com menos de 6 meses de idade e primova-cinados e 12 meses em animais revacinados. Revacinar a cada 6 meses com dose única. Aplicar em bovinos com mais de 3 meses. Pode ser aplicada em fêmeas prenhes.

Apresentação: Frascos de 100 ml (50 doses bovinas e suínas e 100 doses ovinas e caprinas) e 250 ml (125 doses bovinas e suínas e 250 doses ovinas e caprinas)

SENASA certificado: 0639/E



Vacina CDVac Aftosa Trivalente

Prevenção de febre aftosa destinada às espécies bovina, ovina, suína e caprina.

Composição: Contém os tipos O, A24 e A2001 do vírus da febre aftosa em células BHK, inativados com BEI, com adjuvante oleoso.

Administração e dosagem: Bovinos e suínos: 2 ml. Ovinos e caprinos: 1ml. Administrar por via intramuscular profunda ou subcutânea atrás da omoplata ou tabela do pescoço. Ela confere imunidade ativa por 6 meses em animais com menos de 6 meses de idade e primova-cinados e 12 meses em animais revacinados. Revacinar a cada 6 meses com dose única. Aplicar em bovinos com mais de 3 meses. Pode ser aplicada em fêmeas prenhes

Apresentação: Frascos de 100 ml (50 doses bovinas e suínas e 100 doses ovinas e caprinas) e 250 ml (125 doses bovinas e suínas e 250 doses ovinas e caprinas)

SENASA certificado: 1065/E



REAGENTES DE DIAGNÓSTICO



Tuberculina PPD Bovina

Reagente de uso no diagnóstico da tuberculose. Usado nos programas de controle e erradicação da doença.

Composição: Derivado de proteína purificada (PPD) de *Mycobacterium bovis* cepa AN 5, inativada na concentração de 1 mg/ml (contendo 32.500 UI/ml).

Administração e dosagem: Uso profissional em medicina veterinária. Aplicar 0,1 ml por animal, por via intradérmica.

Apresentação: Frascos de 2 ml, 5 ml e 10 ml.

SENASA certificado: 99028



Tuberculina PPD Aviária

Reagente de uso no diagnóstico comparativo ou diferencial da tuberculose em bovinos, ovinos, caprinos e suínos e diagnóstico de tuberculose em aves.

Composição: Derivado de proteína purificada aviária (PPD) de culturas de *Mycobacterium avium* cepa D4 ER inativada, em uma concen-tração de proteína de 0,5 mg/ml (contendo 25.000 UI/ml).

Administração e dosagem: Uso profissional em medicina veterinária. Bovinos, ovinos, caprinos e suínos: 0,1 ml, por via intradérmica.

Aves: 0,05 ml, por via intradérmica.

Apresentação: Frascos de 1 ml, 2 ml e 5 ml.

SENASA certificado: 14-085



BPA Antígeno Tamponado para Placa

Reagente para uso no diagnóstico sorológico de brucelose em bovinos e suínos. Utilizado no Plano Nacional de Controle e Erradica-ção da doença.

Composição: Cultura inativada de *Brucella abortus*, cepa 1119-3, com concentração celular final de 11%.

Apresentação: Frascos de 12 ml (396 determinações).

SENASA certificado: 01-302

Certificate: 01-302



Rosa de Bengala

Reagente para utilização no teste sorológico rápido em placas de brucelose em bovinos, suínos, equinos, ovinos, caprinos e búfalos.

Composição: Cultura inativada de *Brucella abortus*, cepa 1119-3, em solução tamponada.

Apresentação: Frascos de 5 ml e 10 ml

SENASA certificado: 22-034



DIAGNÓSTICO E VACINAS
PARA A SAÚDE ANIMAL

VADEMÉCUM

Comércio Internacional

CDV é um laboratório argentino com 40 anos de história, especial-izado no desenvolvimento, produção e comercialização de produtos e serviços para a prevenção e diagnóstico das principais doenças que afetam os rebanhos bovinos e ovinos. Sua planta de produção de biológicos possui certificação GMP concedida pelo SENASA, com uma capacidade de produção de mais de 70 milhões de doses de vacinas para ruminantes.

A Planta de Vacina Antiaftosa tem uma capacidade de produção de mais de 60 milhões de doses de vacinas, destinadas ao mercado nacional e à região. Através do seu Serviço de Diagnóstico, de sua completa linha de produtos orientada à prevenção e trabalhando ao lado do profissional veterinário e entidades sanitárias, alcança uma sinergia única para contribuir para o aumento da produtividade pecuária.

COMPLEXO CERATOCONJUNTIVITE



Vacina CDVac Querato Plus

Preventiva de sintomas oculares, nervosos e respiratórios causados pelos vírus IBR, BVD/MD, HVB-5 e pelas bactérias associadas *Moraxella bovis* e *Moraxella ovis* (*Branhamella ovis*).

Composição: Culturas inativadas do vírus da rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR), da diarreia viral bovina/doença das mucosas (BVD/MD) e da encefalite herpética bovina (HVB-5) e bactéria de *Moraxella bovis* e *Moraxella ovis* (*Branhamella ovis*), a partir de cepas isoladas de casos clínicos, com adjuvante de hidróxido de alumínio.

Administração e dosagem: Bovinos: 5 ml; via subcutânea. Aplicar duas doses com intervalo de 20-30 dias na primoinoculação em bovinos com mais de 2 meses de idade. Pode ser aplicada em fêmeas prenhes em qualquer trimestre da gestação. Revacinar 1 ou 2 vezes ao ano, conforme critério do médico veterinário.

Apresentação: Frascos de 250 ml (50 doses bovinas).

SENASA certificado: 15-029



COMPLEXO RESPIRATÓRIO



Vacina CDVac Feedlot Plus

Preventiva de sintomas respiratórios, nervosos e oculares causados pelos vírus IBR, BVD/MD, PI3, HVB-5 e BRSV e pelas bactérias *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Moraxella bovis* e *Moraxella ovis* (*Branhamella ovis*) e *Histophilus somni*.

Composição: Culturas inativadas do vírus da rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR), da diarreia viral bovina/doença das mucosas (BVD/MD), da encefalite herpética bovina (HVB-5) e da parainfluenza bovina 3 (PI3), do vírus sincicial respiratório bovino (BRSV) e bactéria de *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica* (*Pasteurella haemolytica*), *Moraxella bovis* e *Moraxella ovis* (*Branhamella ovis*) e *Histophilus somni* (*Haemophilus somnus*), a partir de cepas isoladas de casos clínicos, com adjuvante de hidróxido de alumínio.

Administração e dosagem: Bovinos: 5 ml; via subcutânea. Aplicar duas doses com intervalo de 20-30 dias na primoinoculação em bovinos com mais de 2 meses de idade. Pode ser aplicada em fêmeas prenhes em qualquer trimestre da gestação. Revacinar 1 ou 2 vezes ao ano, conforme critério do médico veterinário.

Apresentação: Frascos de 250 ml (50 doses bovinas).

SENASA certificado: 14-129



Vacina CDVac Respiratória

Preventiva de sintomas respiratórios causados pelos vírus de IBR, BVD/MD, PI3, BRSV e pelas bactérias *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica* e *Histophilus somni*.

Composição: Culturas inativadas do vírus da rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR), da diarreia viral bovina/doença das mucosas (BVD/MD), da parainfluenza bovina 3 (PI3) e do vírus sincicial respiratório bovino (BRSV) e bactéria de *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica* (*Pasteurella haemolytica*) e *Histophilus somni* (*Haemophilus somnus*), a partir de cepas isoladas de casos clínicos, com adjuvante oleoso em dupla emulsão.

Administração e dosagem: Bovinos: 5 ml; via subcutânea. Aplicar duas doses com intervalo de 20-30 dias na primoinoculação em bovinos com mais de 3 meses de idade. Pode ser aplicada em fêmeas prenhes. Revacinar anualmente com dose única, conforme critério do médico veterinário.

Apresentação: Frascos de 250 ml (50 doses bovinas).

SENASA certificado: 01-301



COMPLEXO REPRODUTIVO



Vacina CDVac Repromax Plus

Preventiva de condições reprodutivas (infertilidade, aborto e morte perinatal) e respiratórias, causadas pelos vírus IBR, BVD e bactérias do gênero *Campylobacter*, *Histophilus somni* e *Leptospira* (8 sorovares).

Composição: Culturas inativadas de vírus da rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR), da diarreia viral bovina/doença das mucosas (BVD/MD) e bactéria de *Histophilus somni* (*Haemophilus somnus*), *Campylobacter fetus fetus*, *Campylobacter fetus venerealis*, *Leptospira interrogans* sorovares Pomona, Wolff, Hardjo, Canicola e *Icterohaemorrhagiae*, *Leptospira kirschneri* sorovar Grippothyphosa, *Leptospira borgpetersenii* sorovares Tarassovi e Hardjo bovis, a partir de cepas isoladas de casos clínicos e cepas de referência, com adjuvante óleo em dupla emulsão.

Administração e dosagem: Bovinos: 5 ml; via subcutânea. Aplicar duas doses com intervalo de 20-30 dias na primoinoculação em bovinos com mais de 3 meses de idade. Pode ser aplicada em fêmeas prenhes. Revacinar anualmente com dose única, conforme critério do médico veterinário.

Apresentação: Frascos de 125 ml (25 doses bovinas) e 250 ml (50 doses bovinas).

SENASA certificado: 0202/E



Vacina CDVac Repromax

Preventiva de condições reprodutivas (infertilidade, aborto e morte perinatal) e respiratórias, causadas pelos vírus IBR, BVD e bactérias do gênero *Campylobacter*, *Histophilus somni* e *Leptospira* (6 sorovares).

Composição: Culturas inativadas de vírus da rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR), da diarreia viral bovina/doença das mucosas (BVD/MD) e bactéria de *Histophilus somni* (*Haemophilus somnus*), *Campylobacter fetus fetus*, *Campylobacter fetus venerealis*, *Leptospira interrogans* sorovares Pomona, Wolff, Hardjo, Canicola e *Icterohaemorrhagiae* e *Leptospira borgpetersenii* sorovar Tarassovi a partir de cepas isoladas de casos clínicos e cepas de referência, com adjuvante oleoso de hidróxido de alumínio.

Administração e dosagem: Bovinos: 5 ml; via subcutânea. Aplicar duas doses com intervalo de 20-30 dias na primoinoculação em bovinos com mais de 3 meses de idade. Pode ser aplicada em fêmeas prenhes. Revacinar anualmente com dose única, conforme critério do médico veterinário.

Apresentação: Frascos de 250 ml (50 doses bovinas).

SENASA certificado: 0103/E



Vacina CDVac DVB-R

Preventiva da diarreia viral bovina em bovinos.

Composição: Emulsão injetável da proteína E2 do vírus BVD tipo 1 a. fusionada com um anticorpo de cadeia simples de APCH, produzido pelo sistema de baculovírus recombinante, com propriedades imunogênicas.

Administração e dosagem: Bovinos: 3 ml; via intramuscular ou subcutânea. Bezerros (a partir dos 6 meses de idade): Aplicar duas doses com intervalo de 30 dias. Animais jovens e adultos previamente vacinados: vacinar com uma dose anual ou conforme critério do médico veterinário.

Apresentação: Frascos de 120 ml (40 doses bovinas) e 240 ml (80 doses bovinas).

SENASA certificado: Extensão certificado 17-154



Vacina CDVac Leptospirose Plus

Preventiva da leptospirose, causa de aborto e infertilidade em bovinos, morte perinatal e mortalidade de bezerros causada por leptospira (8 sorovares).

Composição: Culturas inativadas de *Leptospira interrogans* sorovares Pomona, Wolff, Hardjo, Canicola e *Icterohaemorrhagiae*, *Leptospira borgpetersenii* sorovar Tarassovi e Hardjo bovis e *Leptospira kirschneri* sorovar Grippothyphosa, a partir de cepas de referência, com adjuvante de hidróxido de alumínio.

Administração e dosagem: Bovinos: 5ml, via subcutânea. Aplicar 2 doses com intervalo de 20-30 dias na primoinoculação em bovinos com mais de 3 meses de idade. Pode ser aplicada em fêmeas prenhes a qualquer momento da gestação. Revacinar anualmente com dose única, conforme critério do médico veterinário.

Apresentação: Frascos de 125 ml (25 doses bovinas) e 250 ml (50 doses bovinas).

SENASA certificado: 24-003



Vacina CDVac Antileptospirose

Preventiva da leptospirose, causa de aborto e infertilidade em bovinos, morte perinatal e mortalidade de bezerros causada por leptospira (6 sorovares).

Composição: Culturas inativadas de *Leptospira interrogans* sorovares Pomona, Wolff, Hardjo, Canicola e *Icterohaemorrhagiae* e *Leptospira borgpetersenii* sorovar Tarassovi, a partir de cepas de referência, com adjuvante de hidróxido de alumínio.

Administração e dosagem: Bovino: 5 ml; via subcutânea. Aplicar duas doses com intervalo de 20-30 dias na primoinoculação em bovinos com mais de 3 meses de idade. Pode ser aplicada em fêmeas prenhes. Revacinar anualmente com dose única, conforme critério do médico veterinário.

Apresentação: Frascos de 250 ml (50 doses bovinas).

SENASA certificado: 0094/E



Vacina CDVac Brucelose cepa 19

Preventiva de aborto bovino infeccioso causado pela *Brucella abortus*.

Composição: Cada dose contém entre 15-30 x 10⁹ células viáveis de *Brucella abortus* cepa 19, atenuada, fase lisa.

Administração e dosagem: Bovinos: 2 ml; por via subcutânea atrás da omoplata ou na parte superior da tabela do pescoço. Aplique uma dose de acordo com os regulamentos locais. Pode ser utilizada em fêmeas bovinas, entre 3 e 8 meses de idade. O produto é apresentado liofilizado a vácuo e deve ser reconstituído com o diluente, momentos antes da aplicação.

Apresentação: Frascos de 20 ml (10 doses bovinas) e 50 ml (25 doses bovinas).

SENASA certificado: 03-264



Vacina CDVac Brucelose cepa RB51

Preventiva de aborto bovino infeccioso causado pela *Brucella abortus*.

Composição: Cada dose contém entre 10-34 x 10⁹ células viáveis de *Brucella abortus* cepa RB51, atenuada, fase rugosa.

Administração e dosagem: Bovinos: 2 ml; por via subcutânea atrás da omoplata ou na parte superior da tabela do pescoço. Aplica-se a fêmeas bovinas com 24 meses ou mais de idade na categoria vaca que estejam em período pré-parto e/ou pós-parto, tendo sido vacinadas com a cepa 19 (entre 3 e 8 meses) durante as campanhas de vacinação sistemática e tendo realizado um diagnóstico sorológico negativo não superior a 6 meses de antiguidade, antes da aplicação da vacina. Será seguido um esquema de vacinação de acordo com a população-alvo, aplicando-se uma dose, e reforçando a aplicação caso a situação epidemiológica o justifique.

Apresentação: Frascos de 20 ml (10 doses bovinas) e 50 ml (25 doses bovinas).

SENASA certificado: 24-171



COMPLEXO CLOSTRIDIAL



Vacina CDVac Clostrimax P-B

Preventiva de perna preta, gangrena gasosa, enterotoxemia, edema maligno, hepatite necrótica, morte súbita, cabeça grande, hemoglobinúria e botulismo produzido por bactérias clostrídios e problemas respiratórios causados por pasteurelose.

Composição: Anaculturas e toxóides de *Clostridium chauvoei*, *Clostridium septicum*, *Clostridium perfringens* tipos A, B, C e D, *Clostridium novyi* tipos A, B e D (C. *haemolyticum*), *Clostridium sordelli*, *Clostridium botulinum* tipos C e D e bacterinas de *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica* (*Pasteurella haemolytica*), a partir de cepas isoladas de casos clínicos, inativadas, com adjuvante de hidróxido de alumínio.

Administração e dosagem: Bovinos: 5 ml; via subcutânea. Ovinos: 3 ml; via subcutânea. Aplicar duas doses com intervalo de 20-30 dias na primoinoculação em bovinos com mais de 3 meses de idade. Pode ser aplicada em fêmeas prenhes em qualquer trimestre da gestação. Revacinar 1 ou 2 vezes ao ano, conforme critério do médico veterinário.

Apresentação: Frascos de 125 ml (25 doses bovinas e 40 doses ovinas) e 250 ml (50 doses bovinas e 80 doses ovinas).

SENASA certificado: 0646/E



Vacina CDVac Clostrimax P

Preventiva de perna preta, gangrena gasosa, enterotoxemia, edema maligno, hepatite necrótica, morte súbita, cabeça grande e hemoglobinúria causadas por bactérias clostrídios e problemas respiratórios causados por pasteurelose.

Composição: Anaculturas e toxóides de *Clostridium chauvoei*, *Clostridium septicum*, *Clostridium perfringens* tipos A, B, C e D, *Clostridium novyi* tipos A, B e D (C. *haemolyticum*), *Clostridium sordelli* e bacterinas de *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica* (*Pasteurella haemolytica*), a partir de cepas isoladas de casos clínicos, inativadas, com adjuvante de hidróxido de alumínio.

Administração e dosagem: Bovinos: 5 ml, via subcutânea. Ovinos: 3 ml, via subcutânea. Aplicar duas doses com intervalo de 20-30 dias na primoinoculação em bovinos com mais de 3 meses de idade. Pode ser aplicada em fêmeas prenhes em qualquer trimestre da gestação. Revacinar 1 ou 2 vezes ao ano, conforme critério do médico veterinário.

Apresentação: Frascos de 50 ml (10 doses bovinas e 16 doses ovinas), 125 ml (25 doses bovinas e 40 doses ovinas) e 250 ml (50 doses bovinas e 80 doses ovinas).

SENASA certificado: 0566/E



Vacina CDVac Clostrimax T

Preventiva de perna preta, gangrena gasosa, enterotoxemia, edema maligno, hepatite necrótica, morte súbita, cabeça grande, hemoglobinúria e tétanos, causadas por bactérias clostrídios.

Composição: Anaculturas e toxóides de *Clostridium chauvoei*, *Clostridium septicum*, *Clostridium perfringens* tipos A, B, C e D, *Clostridium novyi* tipos A, B e D (C. *haemolyticum*), *Clostridium sordelli* e *Clostridium tetani*, a partir de cepas isoladas de casos clínicos, inativadas, com adjuvante de hidróxido de alumínio.

Administração e dosagem: Bovinos: 5 ml; via subcutânea. Ovinos: 2 ml; via subcutânea. Aplicar duas doses com intervalo de 20-30 dias na primoinoculação em bovinos com mais de 3 meses de idade. Pode ser aplicada em fêmeas prenhes em qualquer trimestre da gestação. Revacinar 1 ou 2 vezes ao ano, conforme critério do médico veterinário.

Apresentação: Frascos de 250 ml (50 doses bovinas e 125 doses ovinas).

SENASA certificado: 15-081



Vacina CDVac Clostridial Polivalente

Preventiva de perna preta, gangrena gasosa, enterotoxemia, hepatite necrótica, edema maligno e morte súbita causadas por bactérias clostrídios.

Composição: Anaculturas e toxóides de *Clostridium chauvoei*, *Clostridium septicum*, *Clostridium perfringens* tipos C e D, *Clostridium novyi* tipo B e *Clostridium sordelli*, a partir de cepas isoladas de casos clínicos, inativadas, com adjuvante de hidróxido de alumínio.

Administração e dosagem: Bovinos: 5 ml; via subcutânea. Ovinos: 3 ml; via subcutânea. Aplicar duas doses com intervalo de 20-30 dias na primoinoculação em bovinos com mais de 3 meses de idade. Pode ser aplicada em fêmeas prenhes no último trimestre da gestação. Revacinar 1 ou 2 vezes ao ano, conforme critério do médico veterinário.

Apresentação: Frascos de 125 ml (25 doses bovinas e 40 doses ovinas) e 250 ml (50 doses bovinas e 80 doses ovinas).

SENASA certificado: 0141/E



Vacina CDVac Botulismo

Preventiva do Botulismo (Mal de Aguapey).

Composição: Toxóides de *Clostridium botulinum* tipos C e D, a partir de cepas isoladas de casos clínicos, inativadas, com adjuvante de hidróxido de alumínio.

Administração e dosagem: Bovinos e equinos: 2 ml; via subcutânea. Ovinos e caprinos: 1 ml; via subcutânea. Aplicar duas doses com intervalo de 20-30 dias na primoinoculação. A revacinação anual com dose única é sugerida a critério do médico veterinário. Pode ser aplicada em fêmeas prenhes em qualquer trimestre da gestação. Filhos de mães vacinadas podem ser vacinados a partir dos 3 meses de idade. Filhos de mães não vacinadas podem ser vacinados a partir dos 2 meses de idade.

Apresentação: Frascos de 250 ml (125 doses bovinas e equinas e 250 doses ovinas e caprinas) e 100 ml (50 doses bovinas e equinas e 100 doses ovinas e caprinas).

SENASA certificado: 0293/E



COMPLEXO ENTÉRICO NEONATAL



Vacina CDVac Diarreia Neonatal Plus

Preventiva de quadros clínicos de diarreia neonatal causada por infecção por rotavírus bovino, coronavírus bovino e as bactérias *Escherichia coli*, *Salmonella spp.* e *Clostridium perfringens* tipo D.

Composição: Culturas inativadas de rotavírus bovino (RVB), coronavírus bovino (CVB) e bacterinas de *Escherichia coli*, *Salmonella dublin* e *Salmonella typhimurium* e toxóide de *Clostridium perfringens* tipo D, a partir de cepas isoladas de casos clínicos e cepas de referência, com adjuvante de hidróxido de alumínio.

Administração e dosagem: Bovinos: 5 ml; via subcutânea. Aplicar duas doses com 20-30 dias de intervalo na fêmea prenhe no último trimestre da gestação. Para bezerros nascidos de mães não vacinadas, aplicar duas doses aos 15 e 30 dias de vida.

Apresentação: Frascos de 250 ml (50 doses bovinas).

SENASA certificado: 14-138

