Vacina

CDVac Clostrimax P-B



Preventiva de perna preta, gangrena gasosa, enterotoxemia, edema maligno, hepatite necrótica, morte súbita, cabeça grande, hemoglobinúria e botulismo produzido por bactérias clostrídios e problemas respiratórios causados por pasteurelose.

Composição: Anaculturas e toxóides de *Clostridium chauvoei, Clostridium septicum, Clostridium perfringens* tipos A, B, C e D, *Clostridium novyi* tipos A, B e D (C. *haemolyticum), Clostridium sordelli, Clostridium botulinum* tipos C e D e bacterinas de *Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica (Pasteurella haemolytica)*, a partir de cepas isoladas de casos clínicos, inativadas, com adjuvante de hidróxido de alumínio.

Administração e dosagem: Bovinos: 5 ml; via subcutânea. Ovinos: 3 ml; via subcutânea. Aplicar duas doses com intervalo de 20-30 dias na primoinoculação em bovinos com mais de 3 meses de idade. Pode ser aplicada em fêmeas prenhes em qualquer trimestre da gestação. Revacinar 1 ou 2 vezes ao ano, conforme critério do médico veterinário.

Apresentação: Frascos de 125 ml (25 doses bovinas e 40 doses ovinas) e 250 ml (50 doses bovinas e 80 doses ovinas).

SENASA certificado: 0646/E

#SaúdeInteligente