


Vacina

# CDVac Clostrimax P



Preventiva de perna preta, gangrena gasosa, enterotoxemia, edema maligno, hepatite necrótica, morte súbita, cabeça grande e hemoglobinúria causadas por bactérias clostrídios e problemas respiratórios causados por pasteurelose.

**Composição:** Anaculturas e toxóides de *Clostridium chauvoei*, *Clostridium septicum*, *Clostridium perfringens* tipos A, B, C e D, *Clostridium novyi* tipos A, B e D (*C. haemolyticum*), *Clostridium sordelli* e bacterinas de *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica* (*Pasteurella haemolytica*), a partir de cepas isoladas de casos clínicos, inativadas, com adjuvante de hidróxido de alumínio.

**Administração e dosagem:** Bovinos: 5 ml, via subcutânea. Ovinos: 3 ml, via subcutânea. Aplicar duas doses com intervalo de 20-30 dias na primoinoculação em bovinos com mais de 3 meses de idade. Pode ser aplicada em fêmeas prenhes em qualquer trimestre da gestação. Revacinar 1 ou 2 vezes ao ano, conforme critério do médico veterinário.

**Apresentação:** Frascos de 50 ml (10 doses bovinas e 16 doses ovinas), 125 ml (25 doses bovinas e 40 doses ovinas) e 250 ml (50 doses bovinas e 80 doses ovinas).

**SENASA certificado:** 0566/E



#SaúdeInteligente