

Vacina

CDVac Feedlot Plus



Preventiva de sintomas respiratórios, nervosos e oculares causados pelos vírus IBR, BVD/MD, PI3, HVB-5 e BRSV e pelas bactérias *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Moraxella bovis* e *Moraxella ovis* (*Branhamella ovis*) e *Histophilus somni*.

Composição: Culturas inativadas do vírus da rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR), da diarreia viral bovina/doença das mucosas (BVD/MD), da encefalite herpética bovina (HVB-5) e da parainfluenza bovina 3 (PI3), do vírus sincicial respiratório bovino (BRSV) e bacterina de *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica* (*Pasteurella haemolytica*), *Moraxella bovis* e *Moraxella ovis* (*Branhamella ovis*) e *Histophilus somni* (*Haemophilus somnus*), a partir de cepas isoladas de casos clínicos, com adjuvante de hidróxido de alumínio.

Administração e dosagem: Bovinos: 5 ml; via subcutânea. Aplicar duas doses com intervalo de 20-30 dias na primoinoculação em bovinos com mais de 2 meses de idade. Pode ser aplicada em fêmeas prenhes em qualquer trimestre da gestação. Revacinar 1 ou 2 vezes ao ano, conforme critério do médico veterinário.

Apresentação: Frascos de 250 ml (50 doses bovinas).

SENASA certificado: 14-129



#SaúdeInteligente