Vacina

CDVac Repromax Plus®

Preventiva de condições reprodutivas (infertilidade, aborto e morte perinatal) e respiratórias, causadas pelos vírus IBR, BVD e bactérias do gênero *Campylobacter, Histophilus somni* e *Leptospira* (8 sorovares).

Composição: Culturas inativadas de vírus da rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR), da diarreia viral bovina/doença das mucosas (BVD/MD) e bacterina de *Histophilus somni (Haemophilus somnus), Campylobacter fetus fetus, Campylobacter fetus venerealis, Leptospira interrogans* sorovares Pomona, Wolffi, Hardjo, Canicola e Icterohaemorrhagiae, *Leptospira kirschneri* sorovar Grippothyphosa, *Leptospira borgpetersenii* sorovares Tarassovi e Hardjo bovis, a partir de cepas isoladas de casos clínicos e cepas de referência, com adjuvante óleo em dupla emulsão.

Administração e dosagem: Bovinos: 5 ml; via subcutânea. Aplicar duas doses com intervalo de 20-30 dias na primoinoculação em bovinos com mais de 3 meses de idade. Pode ser aplicada em fêmeas prenhes. Revacinar anualmente com dose única, conforme critério do médico veterinário.

Apresentação: Frascos de 125 ml (25 doses bovinas) e 250 ml (50 doses bovinas).

SENASA certificado: 0202/E

#SaúdeInteligente