

Vacina CDVac Repromax



Preventiva de condições reprodutivas (infertilidade, aborto e morte perinatal) e respiratórias, causadas pelos vírus IBR, BVD e bactérias do gênero *Campylobacter*, *Histophilus somni* e *Leptospira* (6 sorovares).

Composição: Culturas inativadas de vírus da rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR), da diarreia viral bovina/doença das mucosas (BVD/MD) e bacterina de *Histophilus somni* (*Haemophilus somnus*), *Campylobacter fetus fetus*, *Campylobacter fetus venerealis*, *Leptospira interrogans* sorovares Pomona, Wolffii, Hardjo, Canicola e *Icterohaemorrhagiae* e *Leptospira borgpetersenii* sorovar Tarassovi a partir de cepas isoladas de casos clínicos e cepas de referência, com adjuvante oleoso de hidróxido de alumínio.

Administração e dosagem: Bovinos: 5 ml; via subcutânea. Aplicar duas doses com intervalo de 20-30 dias na primoinoculação em bovinos com mais de 3 meses de idade. Pode ser aplicada em fêmeas prenhes. Revacinar anualmente com dose única, conforme critério do médico veterinário.

Apresentação: Frascos de 250 ml (50 doses bovinas).

SENASA certificado: 0103/E



#SaúdeInteligente