

Recomendaciones generales

Elección de la Vacuna

- *Realizar un Diagnóstico de Situación junto al Veterinario para determinar contra qué enfermedades vacunar y el momento óptimo para hacerlo.
- *Identificar categorías a vacunar.
- *Llevar registro de Vacunaciones: nombre de vacuna, marca, fecha de vencimiento, serie, categorías vacunadas y fecha de aplicación.

Almacenamiento


- *Almacenar las vacunas de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta
- *Respetar siempre la cadena de frío. Conservar entre 4° y 8°C.
- *Evitar el congelamiento.
- *Evitar la exposición directa a la luz solar.
- *No reutilizar frascos abiertos con anterioridad.

Manejo del Instrumental

- *Uso del instrumental por personal capacitado, preferentemente por un profesional veterinario o bajo su supervisión directa.
- *Usar jeringas limpias, desinfectadas y en buen estado junto a agujas con buen filo y reemplazarlas en la medida que lo necesiten.
- *Evitar el uso de instrumentos viejos o en mal estado.
- *Evitar el uso de material contaminado o vencido.
- *Desechar los materiales utilizados lejos del área de trabajo en contenedores específicos diferenciados entre sí según el material descartado.

Aplicación

- *Revisar fechas de Vencimiento.
- *Para no afectar la calidad de la carne y del cuero, se recomienda vacunar en forma subcutánea en la región de la tabla del cuello o en la parte posterior de la paleta.



- *Homogeneizar previo al uso y durante el mismo, agitando periódicamente el frasco.
- *Leer cuidadosamente las instrucciones de uso y aplicarlas correctamente.

Código de colores por línea

> COMPLEJO QUERATOCONJUNTIVITIS
Vacuna CDVac Querato Plus
> COMPLEJO RESPIRATORIO
Vacuna CDVac Feedlot Plus
Vacuna CDVac Respiratoria
Vacuna CDVac Feedlot
> COMPLEJO REPRODUCTIVO
Vacuna CDVac Reproductiva
Vacuna CDVac Reproductiva Plus
Vacuna CDVac Leptospirosis
Vacuna CDVac Campy 40
Vacuna CDVac Brucelosis cepa 19
Vacuna CDVac Brucelosis cepa RB51
> COMPLEJO CLOSTRIDIAL
Vacuna CDVac Clostrimax T
Vacuna CDVac Clostridial Polivalente
Vacuna CDVac Clostridial Triple
Vacuna CDVac Botulismo
Vacuna CDVac Hemoglobinuria
> COMPLEJO ENTÉRICO NEONATAL
Vacuna CDVac Diarrea Neonatal Plus
> AFTOSA
Vacuna CDVac Aftosa
> RABIA
Vacuna CDVac Rabia
> CARBUNCLO
Vacuna CDVac Carbunclo
> REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO
Tuberculina PPD Aviar
Tuberculina PPD Bovina
Antígeno Bufferado para Placa BPA



SAS

SISTEMA DE APLICACIÓN SEGURA

SAS es un sistema creado por CDV para casos de aplicaciones múltiples.

Funciona cuando el veterinario inocular animales con distintos productos a la vez.



A

Retire el adhesivo del envase



B

Pegue en la jeringa de la vacuna a inocular

ESCANEA PARA MÁS INFO



#SanidadInteligente

www.cdv.com.ar

011 3312 - 2CDV (238)

| @labcdv



Esquema Sanitario Básico


Recomendaciones generales para uso y aplicación de biológicos



Complejos Infecciosos

PRINCIPALES PRESENTACIONES	PRINCIPALES CATEGORÍAS AFECTADAS
COMPLEJO QUERATOCONJUNTIVITIS	
HVB-1 (IBR - Rinotraqueítis Infecciosa Bovina) HVB-5 (Encefalitis Infecciosa de los terneros) BVD (Diarrea Viral Bovina) <i>Moraxella bovis</i> <i>Branhamella ovis</i>	Afectan principalmente a categorías jóvenes o de reposición, aunque frecuentemente la infección pasa a categorías mayores.
COMPLEJO RESPIRATORIO	
IBR (Rinotraqueítis Infecciosa Bovina) HVB-5 (Encefalitis Infecciosa de los terneros) BVD (Diarrea Viral Bovina) PI3 (Parainfluenza bovina 3) BRV (Virus Respiratorio Sincial Bovino) <i>Pasteurella multocida</i> <i>Mannheimia haemolytica</i> <i>Histophilus somni</i> <i>Moraxella bovis</i> <i>Branhamella ovis</i>	Afectan principalmente a categorías jóvenes o de reposición.
COMPLEJO ENTÉRICO NEONATAL	
Rotavirus Coronavirus <i>Escherichia coli</i> <i>Salmonella</i> <i>Clostridium perfringens</i> tipo D	Principalmente actúan sobre la etapa neonatal. Se recomienda su uso en madres para inmunizar a la cría vía calostro.
COMPLEJO REPRODUCTIVO	
IBR (Rinotraqueítis Infecciosa Bovina) BVD (Diarrea Viral Bovina) <i>Leptospirosis</i> <i>Campylobacter</i> <i>Histophilus somni</i> <i>Brucella</i> *	Afectan principalmente a adultos en etapa reproductiva, tanto machos como hembras. *Vacunación obligatoria en terneras entre 3 y 8 meses de edad. (Plan Nacional de Control y Erradicación)
COMPLEJO CLOSTRIDIAL	
Mancha Gangrena gaseosa Enterotoxemia Muerte súbita Hepatitis necrótica Cabeza hinchada Hemoglobinuria Botulismo Tétanos Edema maligno	Afectan principalmente a categorías Jóvenes o de reposición
CARBUNCLO	
Carbunclo Bacteridiano	Afecta en general a animales mayores a 1 año
AFTOSA	
Fiebre Aftosa	Tetravalente de uso obligatorio Actualmente 2 dosis anuales. (<i>Plan Nacional de Control y Erradicación</i>)
RABIA	
Rabia	Elaborada a partir de virus rábico Cepa Pasteur. Vacunar a partir de los 3 meses de edad y revacunar a los 6 meses. Revacunar anualmente.

Esquema Sanitario Básico*



* Modificaciones sujetas a criterio del profesional veterinario.
Para más información sobre cada vacuna, escanea el código QR de los frascos.

Servicio

Tacto

Parición

Campañas Vacunación Aftosa